

											Termín ošetření													
Kód	Název	Organismus	Obsah balení	Škůdce	Skladování (počítáno od data výroby)	Leadnice	Aplikace Není možná preventivní ochrana.	Doba působení	Ošetřovaná rostlina	Plocha	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	termín ošetření	
160158	Parazitické hlístice proti plzákům a slimákům (12 milionů) – Nemaslug	Phasmarhabditis	parazitické hlístice 12 milionů ks	slimáci, plzáci	ANO / při teplotě 50 °C/ /max. 3-4 týdny	ANO	Zálivka, macerace slimáků v nádobě a vypuštění do zahrady. Teplota půdy min.10 °C.	6 týdnů	travníky, zeleninové zahrádky	40 m²														IV., V.- X. jakmile začne aktivita slimáků
179036	Parazitické hlístice proti lalokonoscům a dalším škůdcům (5 milionů) – Nemamax	Heterorhabditis downesi	parazitické hlístice 5 milionů ks	larvy chroustů, lalokonosci, listokazi a klikoroh	ANO / při teplotě 40 °C-80 °C/ /max.6 týdnů	ANO	Zálivka, postřik ideálně navečer. Teplota půdy 8 °C–25 °C POZOR: Nemamax je efektivnější vůči larvám a kuklám, nepůsobí na dospělé.	dlouhodobý	pastviny a travníky, ovocné, okrasné a lesní školky, ovocné dřeviny, jahody a brambory	10 m²														II.-X.
																								lalokonosci
																								listokazi
																								chrousti
160159	Parazitické hlístice proti larvám lalokonosců (5 milionů) – Nematop	Heterorhabditis	parazitické hlístice 5 milionů ks	lalokonosci rodu Otiiorhynchus	ANO / při teplotě 40 °C-120 °C/ /max.6 týdnů	ANO	Zálivka, postřik, máčení. Teplota půdy 12° C –25 °C	dokud jsou přítomni lalokonosci	okrasné rostliny, rododendrony, jahody, fazol	10 m²													V.-IX.(X.)	
179026	Parazitické hlístice proti dospělcům lalokonosců (2,5 mil.) – Nematop BroukFree	Steirnernema carpocapsae	parazitické hlístice 1 deska	dospělec brouka lalokonosce.	ANO / při teplotě 40 °C-120 °C/ /max.6 týdnů	ANO	Paletku položte drážkami s gelem a nematodami na půdu, umístěte do stínu pod rostliny a udržujte vlhké.	dokud jsou přítomni lalokonosci	okrasné rostliny, rododendrony, jahody, fazol	10 m²													V.-IX.(X.)	
160166	Parazitické hlístice proti smutnicím (5 milionů) – Nemaplus	Steirnernema feltiae	parazitické hlístice 5 milionů ks	larvy smutnic	ANO / při teplotě 40 °C-120 °C/ /max.6 týdnů	ANO	Zálivka, postřik. Asi 1dl/květináč 15–20cm. Teplota půdy při aplikaci min.10 °C.	6 týdnů	zelenina i okrasné rostliny, pokojové rostliny – skleníky, interiéry	10 m²													I.-XII.	
179032	Parazitické hlístice proti přezimujícím škůdcům a obalečím jablčného (10 milionů) – Nemapom	Steirnernema feltiae	parazitické hlístice 10 milionů ks	larvy obaleče a přezimujících škůdců	ANO / při teplotě 40 °C-120 °C/ /max.6 týdnů	ANO	Postřik na podzim. Teplota při a po aplikaci by se měla pohybovat v rozmezí +8 až +10 °C alespoň po několik hodin. U výsadeb starších 5-ti let aplikujte na kmeny i na větve, kde je kůra porézní.	dokud jsou přítomny larvy škůdců	ovocné stromy – jaderoviny – zahrada	5 l postřikové kapaliny													IX.-X.	
179025	Parazitické hlístice proti ponravám chroustů a chroustků (5 milionů) – NemaGreen	Heterorhabditis bacteriophora	parazitické hlístice 5 milionů ks	larvy chroustů a chroustků			Postřik nebo zálivka na zasaženou půdu. Teplota půdy od 12 až 25 °C, zajištění vlhkosti.	po dobu výskytu larev	ochraně pastvin a travníků před chrousty	10 m²														VII.-IX.
160168	Dravý roztok proti sviluškám, hálčivcům, vlnovníkům (25 ks) – Typhlodromus Pyri	Typhlodromus Pyri	25 plstěných pásů s dravými roztoky	sviluška ovocná a chmelová, hálčivci, vlnovníci, larvy třásněnek	ANO / max 14 dní od data výroby, teplota do 7 °C. Aplikovat v mrazu na větve – obalení a přichycení drátkem či provázekem.	ANO	Přípevnění plstěného pásu na větve či kmen. Teploty do 0°C.	dlouhodobě (trvale i několik let), přezimuje v zahradě	réva, ovocné stromy a keře – zahrada Pouze venkovní použití!	1 ks/keř révy 1-3 ks/ ovocný strom													XII.-II.	
160160	Dravý roztok proti sviluškám (100 ks) do skleníku – Phytoseiulus persimilis plus	Phytoseiulus persimilis	dravý roztok 100 ks	sviluška chmelová	NE / aplikovat ihned po zjištění prvních svilušek. Nelze aplikovat preventivně.	NE	Posyp na napadená místa rostlin sviluškou (není potřeba rosit) Teplota 15 °C – 25°C .	5-25 dnů (působí po dobu výskytu svilušky)	zelenina i okrasné rostliny – skleníky, fóliovníky, zimní zahrady, interiéry	2 - 50ks/m³													VI.-IX.	
160163	Dravý roztok proti třásněnkám (5tis. ks) – Amblyseius cucumeris	Amblyseius cucumeris	dravý roztok 5 000 ks	třásněnky (A. cucumeris svilušky nežere)	NE / Aplikovat na počátku výskytu třásněnek.	NE	Posyp a ponechání k ochraně po dobu 1-2 týdnů. Teplota nad 15 °C.	po dobu výskytu třásněnek	zelenina i okrasné rostliny – skleníky, fóliovníky, zimní zahrady, interiéry	30 m² (50-100 ks/ /m²)													V. - IX.	
179035	Dravý roztok proti třásněnkám a molicím (100 sáčků) – Swirsky Mite Plus	Amblyseius swirskii ve směsi s otrubami	dravý roztok 100 sáčků v každém 250 roztočů	larvy třásněnek molic, svilušky a jiní roztoči	NE / max. 2 dny od dodání zásilky při teplotě 10 - 14 °C	NE	Ručně, rozvěšením na rostliny do míst výskytu škůdce tak, aby sáčky nebyly na přímém slunci. Swirskii vyžaduje teploty min. 20-22 °C a vlhkost 70 %.	po dobu výskytu škůdců	zelenina i okrasné rostliny – skleníky, fóliovníky, zimní zahrady, interiéry	až 50-100 rostlin 1-2 sáčky na rostlinu (dle velikosti rostliny)													VI.-IX.	
160164	Dravá bejlomorka proti koloniím mšic (100 ks) – Aphidoletes aphidimyza	Aphidoletes aphidimyza	Kukly s bejlomorkou 100 ks	mšice v koloniích	NE / Bejlomorka se aplikuje ihned při výskytu mšic v koloniích.	NE	Otevřená krabíčka položená do zastíněného místa výskytu mšic. Teplota nad 15 °C. Lze normálně větrat.	po dobu výskytu mšic	zelenina i okrasné rostliny – skleníky, fóliovníky, zimní zahrady, interiéry	10 m² 1-3 ks/m² 1-10 ks/ /rostl.													V.-IX.(X.)	
160161	Parazitické vosičky proti molicím (200 ks) – Encarsia formosa	Encarsia formosa	pupária s parazitickými vosičky 200 ks	molice	NE / Aplikovat až při prvním výskytu molic.	NE	Kartičky s pupárií zavěsit na napadené rostliny. Teplota nad 15 °C.	po dobu výskytu molic	zelenina i okrasné rostliny – skleníky, fóliovníky, zimní zahrady, interiéry	20 m²														V. - IX.
160165	Parazitické vosičky proti molicím (1 tis. ks) – Encarsia formosa	Encarsia formosa	pupária s parazitickými vosičky 1 000 ks							100 m²														
160162	Parazitické vosičky proti mšicím (100 ks) – Aphidius colemani	Aphidius colemani	pupária parazitické vosičky 100 ks	mšice	NE / Aplikovat na počátku výskytu mšic. Nelze aplikovat preventivně.	NE	Otevřená lahvička umístěna pod rostliny min. na 1 týden (nebo nasypat pod rostliny, vyhnout se mravencům). Nesmí dojít k vysušení, rosit! (spíše se vyhnout přímému slunečnímu záření, není potřeba rosit) Teplota nad 15 °C.	po dobu výskytu mšic	zelenina i okrasné rostliny – skleníky, fóliovníky, zimní zahrady, interiéry	25 m² 1-4ks/m²													V. - IX.	
179034	Dravé slunéčko proti červcům (1000 larev) – Cryptobug-L (Cryptolaemus montrouzi)	Cryptolaemus montrouzi	larvy dravého slunéčka 1000 ks	červci ve všech stádiích	NE / max. 2 dny od dodání zásilky při teplotě 10 - 15 °C	NE	Nasypat nejlépe do míst s výskytem červců. Porost před aplikací porosit. Aplikujte co nejdříve po obdržení zásilky.	po dobu výskytu červců	zelenina i okrasné rostliny – skleníky, fóliovníky, zimní zahrady, interiéry	5-40 ks/m² (míněno počet larev)													celoročně pokud je dodržena teplota	

